
Das Reh und die Brunft



Vortragende:


Annabel Schnarre, Nikolai Albers, Sabine Eckert, Silke Horstmann

Landesjagd- und
Naturschutzverband
Hamburg



Hirsche in Europa

Es gibt 6 Hirscharten in Europa
Und über 80 weltweit



Rothirsch



Damhirsch



Sikahirsch



Ren



Reh



Elch



Hirsche in Europa

Landesjagd- und
Naturschutzverband
Hamburg




🦌 Geweihträger

🦌 Pflanzenfresser

🦌 Wiederkäuer

🦌 Paarhufer



Rothirsch



Damhirsch



Sikahirsch



Ren




Reh




Elch



Größenunterschiede der Hirsche



Größenunterschiede der Hirsche



Geweih und Horn – Wo ist der Unterschied?

Landesjagd- und
Naturschutzverband
Hamburg



Geweih

- 🦌 Besteht aus Knochen
- 🦌 Wächst aus dem Schädel
- 🦌 Wird jährlich abgeworfen
- 🦌 Ablesen des Alters **nicht** möglich



Horn

- 🦌 Ist ein Hautorgan (wie Fingernägel)
- 🦌 Wächst aus einem Knochenzapfen
- 🦌 Wird **nicht** abgeworfen
- 🦌 Ablesen des Alters ist möglich



Duftdrüsen – wie Rehe kommunizieren


Landesjagd- und
Naturschutzverband
Hamburg



Rehe haben mehrere Duftdrüsen, mit denen sie Botschaften übermitteln können.

Zweck:

- 🦌 Revier markieren
- 🦌 Partner anlocken & Paarungsbereitschaft signalisieren



Die Brunft

Landesjagd- und
Naturschutzverband
Hamburg



- 🦌 9-10 Wochen nach dem Setzen der Kitze wird die Ricke wieder brunftig.
- 🦌 Der Rehbock sucht die Nähe der Ricke.
- 🦌 Es entsteht eine regelrechte Hetzjagd über hunderte von Metern.
- 🦌 Die Ricke verlangsamt die Flucht und flüchtet nicht mehr geradlinig, sondern kreisförmig (Hexenringe).
- 🦌 Anschließend kommt es zum Beschlagen der Ricke durch den Bock.



Brunftzeit:
Mitte Juli – Mitte August



Die Brunft

Landesjagd- und
Naturschutzverband
Hamburg



Rehkitze und die Rehkitzrettung

Nach $9\frac{1}{2}$ Monaten werden die Kitze gesetzt. Meist sind es 2, selten 1 oder 3 Kitze.

Dabei gibt es eine $4\frac{1}{2}$ monatige Eiruhe, so dass es nach der Befruchtung, zu einer Pause der Entwicklung kommt.

So wird sichergestellt, dass die Kitze zur Welt kommen, wenn bereits genug Grünpflanzen Platz für Deckung und Nahrung bieten.



Setzzeit:
Mai – Juni



Rehkitze und die Rehkitzrettung

Nach $9\frac{1}{2}$ Monaten werden die Kitze gesetzt. Meist sind es 2, selten 1 oder 3 Kitze.



Setzzeit:
Mai – Juni

Dabei gibt es eine $4\frac{1}{2}$ monatige Eiruhe, so dass es nach der Befruchtung, zu einer Pause der Entwicklung kommt.

So wird sichergestellt, dass die Kitze zur Welt kommen, wenn bereits genug Grünpflanzen Platz für Deckung und Nahrung bieten.

Im April – Juni mäht auch der Landwirt seine Wiesen.



Revierverhalten

Landesjagd- und
Naturschutzverband
Hamburg



Sommer

- 🦌 Einzelgängerisch
- 🦌 Territorial
- 🦌 Reviere werden von einzelnen Tieren beansprucht



Winter

- 🦌 Zusammenschluss zu „Sprüngen“
- 🦌 Gemeinsame Reviernutzung



Äsungsverhalten der Rehe

Rehe sind selektive Äser.

Sie bevorzugen eine abwechslungsreiche Nahrung.

Kräuter, Gräser, Blätter, Knospen und Triebe.

Viele Male über den Tag verteilt wird geäst. Dazwischen gibt es Ruhephasen, in denen wiedergekaut wird.



Wald-Wild-Konflikt

Interessengegensatz Mensch – Tier

Wildtiere – und besonders das Reh – ernähren sich vom Wald

Aber:

Die Wildtiere und auch das Reh sind natürliche
Bestandteile des Waldes



Wald-Wild-Konflikt

Interessengegensatz Mensch

Wildtiere – und besonders da

Aber:

Die Wildtiere und auch das R

Bestandteile des Waldes



Fragen?

Landesjagd- und
Naturschutzverband
Hamburg

